

STEFES KOMBI

BLATTDÜNGER

- ❶ **Für die intervenierende und präventive Versorgung mit Kalium, Magnesium, Stickstoff und Schwefel**
- ❷ **Wenn die natürliche Aufnahme von Nährstoffen aus dem Boden beeinträchtigt ist, z.B. durch ungünstige Witterung**
- ❸ **Für Kulturen mit hohem Stickstoff- und Kaliumbedarf**

STEFES KOMBI ist ein hochkonzentrierter Spezialdünger, der alle Pflanzen – von Acker- und Gemüsekulturen bis hin zu Obstpflanzen – optimal mit essenziellen Nährstoffen versorgt. Dank der ausgewogenen Kombination aus Makro- und Mikronährstoffen beugt er gezielt Mangelerscheinungen vor, stabilisiert das Pflanzenwachstum und fördert eine gesunde Entwicklung. Ob zur präventiven Stärkung oder als schnelle Hilfe in kritischen Phasen – mit STEFES KOMBI sichern Sie die bestmögliche Ernährung Ihrer Pflanzen und steigern nachhaltig deren Widerstandskraft und Ertrag.

Zusammensetzung	20 % w/w = 276 g/l N + 15 % w/w = 207 g/l K ₂ O + 2 % w/w = 27,6 g/l MgO + Mikronährstoffe
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Dichte	1,38 kg/l
pH-Wert	6,0–7,5
UFI Nummer	KHKR-36KX-N99D-REC6
Verkaufsgebinde	10L → 13,8 kg

Kulturen	Dosierung (l/ha)	Aufwandmenge und Anwendungszeitpunkt
Zuckerrüben	3	2 Anwendungen: Vom 4–6-Blattstadium bis zum vollständigen Schließen des Blattapparates (BBCH 16–39), in Abständen von 12–14 Tagen
Zwiebeln, Lauch	3–5	2–3 Anwendungen: Ab dem 3–4-Blattstadium (BBCH 13–25) oder 2 Wochen nach der Pflanzung, in Abständen von 7–14 Tagen
Hopfen	3	3 Anwendungen: Während der intensiven Wachstumsphase
Obstbäume und Sträucher	3	3 Anwendungen: Ab dem rosa/weißen Knospenstadium (BBCH 51)
Kohl, Blumenkohl, Brokkoli	3–5	2–3 Anwendungen: Ab dem 4–6-Blattstadium (BBCH 15–19), in Abständen von 7–14 Tagen
Mais	2–3	2 Anwendungen: Vom 4- bis 8-Blattstadium (BBCH 15–18)
Möhren, Petersilie	3–5	2–3 Anwendungen: Ab dem Stadium der Rübenwurzelbildung (BBCH 41–50) bis 3 Wochen vor der Ernte, in Abständen von 7–14 Tagen
Gurken, Tomaten	3–5	2–3 Anwendungen: Ab dem 3-4-Blattstadium (BBCH 13–25) (oder 2 Wochen nach der Pflanzung), in Abständen von 7–10 Tagen
Raps	2	3 Anwendungen: Vom Wachstumsbeginn bis zum Beginn der Knospenentwicklung (BBCH 30–50)
Getreide	2	2–3 Anwendungen: Nach Wachstumsbeginn bis zum Ende des Ährenschiebens (BBCH 25–59)
Kartoffeln	2–3	3 Anwendungen: Die Erste während der intensiven Blatt- und Stängelentwicklung (BBCH 19–49), die Zweite zu Beginn der Blüte (BBCH 51–55), die Dritte 12 Tage nach der zweiten Anwendung

Achtung: Der Dünger darf nicht mit Phosphatdüngern gemischt werden.

STEFES GmbH

Wendenstr. 21 a · D-20097 Hamburg

Tel: +49 (40) 533-08-33-0 · E-mail: info@stefes.eu · www.stefes.eu

Allgemeine Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung. Keine Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig. Vor Anwendung des Produktes sind die Gebrauchsanweisung und das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig zu lesen. Alle Produktinformationen sind sorgfältig recherchiert und auf dem neuesten Stand, können jedoch nur unverbindlich informieren.