

STEFES

STEFES MACRO P

BLATTDÜNGER

- **Für die intervenierende und präventive Versorgung mit Phosphor, Stickstoff und Kalium**
- **Erhöht die Stresstoleranz im Zusammenhang mit der Entwicklung von Pilzkrankheiten oder Schädlingsbefall**
- **Verbessert das Wassermanagement der Pflanzen und erhöht ihre Toleranz gegenüber Trockenheit**

Maximieren Sie das Wachstum Ihrer Pflanzen mit STEFES MACRO P – der leistungsstarken Suspensionsformulierung mit extra viel Phosphor. Dank perfekt abgestimmter Makro- und Mikronährstoffe erhält die Kultur genau das, was sie braucht – für kräftige Wurzeln, starke Pflanzen und reiche Ernten. Schnelle Hilfe bei Phosphormangel: Ob vorbeugend oder zur schnellen Korrektur – STEFES MACRO P gleicht sichtbare und versteckte Phosphor-Defizite zuverlässig aus. Besonders in kritischen Wachstumsphasen liefert unser Dünger die entscheidende Unterstützung. STEFES MACRO P kann als Vorbeugungsmaßnahme in bestimmten Wachstumsphasen von Pflanzen oder als Interventionsmaßnahme im Falle von Makronährstoffmangel eingesetzt werden.

Zusammensetzung	10 % w/w = 136 g/l N + 20 % w/w = 272 g/l P_2O_5 + 10 % w/w = 136 g/l K_2O + Bor 0,035% w/w (0,48 g/l) + Cu 0,045% w/w (0,61 g/l) + Fe 0,1% w/w (1,36 g/l) + Mn 0,015% w/w (0,20 g/l) + Mo 0,007% w/w (0,10 g/l) + Zn 0,035% w/w (0,48 g/l)
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Dichte	1,36 kg/l
pH-Wert	5,0–6,0
Fertigation	Konzentration von 0,3% nicht überschreiten
UFI Nummer	–
Verkaufsgebinde	10 L → 13,6 kg

Kulturen	Dosierung (l/ha)	Aufwandmenge und Anwendungszeitpunkt
Feldgemüse	3	3 Anwendungen: Ab der zweiten Woche nach Pflanzung alle 12–14 Tage
Zuckerrüben	2	2–3 Anwendungen: Vom 4–6-Blattstadium bis zum Reihenschluss
Obstbäume	5	1–2 Anwendungen: Zu Beginn der Vegetationsperiode, während der Blattentwicklung, bis zum Stadium „grüne Knospe“ bzw. „rosa Knospe“. Mindestabstand zwischen den Anwendungen: 7–10 Tage.
Wintergetreide	3	2 Anwendungen: Eine Anwendung im Herbst ab dem 3–4 Blattstadium bis 10–14 Tage vor der Winterruhe. Im Frühjahr eine Behandlung von der Wiederaufnahme des Wachstums bis zum Beginn des Ährenschieben.
Sommergetreide	3	Eine Anwendung: Ab 3–4 Blattstadium
Winterraps	3	3 Anwendungen: Im Herbst 2 Anwendungen: die erste ab dem 4–6-Blattstadium, die nächste bis zwei Wochen vor Ende der Herbstvegetation (BBCH 13–25). Im Frühjahr 1 Anwendung ab Vegetationsbeginn, die nächste bis zum Beginn der Blüte (BBCH 30–51) alle 12–14 Tage.
Mais	3	2 Anwendungen: Die erste im 3–5-Blattstadium (BBCH 15–18), die zweite 14 Tage später.
Kartoffeln	2–3	2–3 Anwendungen: Vom Knollenansatz bis zum Erreichen von 40 % der Endknollenmasse (BBCH 35–73), in Abständen von 12–14 Tagen.
Beeren (Kulturheidelbeeren)	3–5	1–2 Anwendungen: Zu Beginn der Vegetationsperiode, während der Blattentwicklung. Mindestabstand zwischen den Anwendungen: 7–10 Tage.

STEFES GmbH
Wendenstr. 21 a · D-20097 Hamburg
Tel: +49 (40) 533-08-33-0 · E-mail: info@stefes.eu · www.stefes.eu

Allgemeine Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung. Keine Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig. Vor Anwendung des Produktes sind die Gebrauchsanweisung und das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig zu lesen. Alle Produktinformationen sind sorgfältig recherchiert und auf dem neuesten Stand, können jedoch nur unverbindlich informieren.

10/2026