

STEFES

STEFES N

BLATTDÜNGER

- **Mineraldünger für die intervenierende und präventive Versorgung mit Stickstoff, Phosphor und Kalium**
- **Stickstoff ist ein wichtiger Bestandteil von Chlorophyll, Vitaminen, Hormonen und der DNA**
- **Verbessert das Wassermanagement der Pflanzen und erhöht die Trockentoleranz**

STEFES N ist das ideale Düngemittel für die gezielte Zusatzernährung und zur Vorbeugung von Nährstoffmangel bei allen landwirtschaftlichen Kulturen und Sonderkulturen. Mit einer ausgewogenen Kombination aus NPK und allen wesentlichen Mikronährstoffen, sorgt es für eine optimale Versorgung Ihrer Pflanzen. Dank seiner modernen Formulierung sind alle Nährstoffe leicht verfügbar und können von den Pflanzen schnell aufgenommen werden. STEFES N fördert das Wachstum und die Entwicklung Ihrer Kulturen und nutzt die physiologischen Stimulationseffekte für eine verbesserte Nährstoffaufnahme, sowohl durch die Blätter als auch über die Wurzeln.

Zusammensetzung	12 % w/w = 141,6 g/l N + 4 % w/w = 47,2 g/l P_2O_5 + 6 % w/w = 70,8 g/l K_2O + Bor 0,011 % w/w (0,13 g/l) + Cu 0,008 % w/w (0,09 g/l) + Mn 0,014 % w/w (0,16 g/l) + Mo 0,001 % w/w (0,0118 g/l) + Zn 0,006 % w/w (0,07 g/l)
Formulierung	Wasserlösliches Konzentrat (SL)
Dichte	1,18 kg/l
pH-Wert	6,5 – 7,5
Fertigation	Konzentration von 0,3 % nicht überschreiten
UFI Nummer	9PJR-16PY-K99F-40HJ
Verkaufsgebinde	20 L → 23,6 kg

Kulturen	Dosierung (l/ha)	Aufwandmenge und Anwendungszeitpunkt
Zuckerrüben	5	3 Anwendungen: 3 – 4-Blattstadium (BBCH 13 – 14) und die nächsten beiden Anwendungen im Abstand von zwei Wochen während der Überdachung (BBCH 31 – 39)
Obstbäume und Sträucher	5	2 Anwendungen: Blattentwicklungsstadium (BBCH 15 – 19) und während der Periode des intensiven Wachstums
Erdbeeren	5	4 Anwendungen: Drei vom Beginn der Vegetation bis zur Ernte und eine nach der Ernte
Mais	5	1 – 2 Anwendungen: Im 4-Blattstadium (BBCH 14 und zwei Wochen nach der ersten Behandlung)
Raps	5	3 Anwendungen: Eine im Herbst im 3-Blattstadium (BBCH 13), zwei im Frühjahr nach der Wiederaufnahme der Vegetation und während der Entwicklung der Blütenknospen (BBCH 30 – 59)
Feldgemüse	5	2 – 3 Anwendungen: Vom zweiten Blattstadium (oder 2 Wochen nach der Pflanzung) bis zur Ernte, im Abstand von 8 – 10 Tagen
Gemüse unter Folie	0,2 – 0,3 %	2 – 3 Anwendungen: Ab dem zweiten Blattstadium oder 2 Wochen nach der Pflanzung bis zur Ernte, in Abständen von 8 – 10 Tagen
Getreide	5	3 – 4 Anwendungen: Eine Anwendung im Herbst ab dem 3-Blattstadium (BBCH 13), 2 – 3 Anwendungen im Frühjahr nach Beginn der Vegetation bis zum Ende des Ährenschiebens, im Abstand von 10 – 14 Tagen
Kartoffeln	5	3 Anwendungen: Erste im Stadium der Triebbildung (BBCH 9 – 11), im Abstand von 10 – 14 Tagen
Zierpflanzen	0,2 – 0,3 %	Eine Anwendung bei der Ausbringung von Blättern und Substrat während der Sämlingsproduktion

STEFES GmbH
Wendenstr. 21 a · D-20097 Hamburg
Tel: +49 (40) 533-08-33-0 · E-mail: info@stefes.eu · www.stefes.eu

Allgemeine Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung. Keine Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig. Vor Anwendung des Produktes sind die Gebrauchsanweisung und das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig zu lesen. Alle Produktinformationen sind sorgfältig recherchiert und auf dem neuesten Stand, können jedoch nur unverbindlich informieren.

10/2026