

PRODUKTINFORMATION

NOCTIS

Referenzprodukt: FOX[®]

Herbizid gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter im Wintergetreide und Winterraps.

Wirkungsweise

NOCTIS ist ein flüssiges Herbizid mit großer Wirkungsbreite gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter in Wintergetreide (außer Winterhafer), in Gräsern (zur Saatguterzeugung) im Nachauflauf/im Frühjahr und im Herbst und im Winterraps im Nachauflauf/im Herbst. NOCTIS zeichnet sich durch die bekannten Wirkungsstärken des Wirkstoffes Bifenox gegen Acker-Stiefmütterchen, Taubnessel-Arten und Ehrenpreis aus und bietet zudem im Raps auch neue Möglichkeiten bei der Bekämpfung von Ackerkrummhals/Ochsenzunge, Rauke Arten, Hirtentäschel, Hellerkraut und Storchschnabel, die sich in vielen Regionen des Rapsanbaues zu Problemunkräutern entwickelt haben. Der Wirkstoff Bifenox wirkt, ähnlich einem Kontaktherbizid, über die jungen Sproßteile und zerstört dort die Zellmembranen der Unkrautpflanzen. Die Wirkung wird durch hohe Lichtintensität und Stoffwechselaktivität verstärkt. Der ausgebrachte Herbizidfilm bleibt 2 bis 3 Wochen auf der Bodenoberfläche aktiv und verhindert damit das Auflaufen von Spätkeimern.

Wirkstoff / Formulierung: 480 g/L Bifenox (41 Gew.-%) SC (Suspensionskonzentrat)

Erhältliche Gebinde: 4x5 L - Artikelnr. 700604

Genehmigungsnummern: GP 024193-00/013

Anwendung*

Kultur	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale
Stadium Kultur	Von 1. Bestockungstrieb sichtbar: Beginn der Bestockung bis Ende der Bestockung; Maximale Anzahl der Bestockungstriebe erreicht
Schadorganismus	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
Stadium Schadorganismus	Von 1. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet; Erste Laubblätter entfaltet bis 6. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet
Anwendungszeitpunkt	nach dem Auflaufen , Frühjahr
Max. Zahl der Behandlungen	In der Anwendung: 1, In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Aufwandmenge	1,5 L/ha in 200 bis 400 L/ha Wasser

Kultur	Winterraps
Schadorganismus	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
Stadium Schadorganismus	Von 1. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet; Erste Laubblätter entfaltet bis 6. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet
Anwendungszeitpunkt	nach dem Auflaufen , Herbst
Max. Zahl der Behandlungen	In der Anwendung: 1, In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Aufwandmenge	1 L/ha in 200 bis 400 L/ha Wasser

Allgemeine Hinweise

Nur für gewerbliche Anwendung. Keine Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.



Vor Anwendung des Produktes sind die Gebrauchsanweisung und das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig zu lesen.

Alle Produktinformationen sind sorgfältig recherchiert und auf dem neuesten Stand, können jedoch nur unverbindlich informieren.

® = Registrierte Marke der Adama Deutschland GmbH

* Anwendungshinweise für weitere zugelassene und/oder genehmigte Kulturen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.